



آزمایشگاه دکتر اینی

تشخیص طبی و آسیب شناسی

۱۳۸۷

راهنمای تهیه نمونه مدفوع جهت آزمایش خون مخفی (OB)

مراجعه کننده ممتزم :

چنانچه به علل مختلف دچار خونریزی از لثه ها و مخاط دهان هستید، خون بلعیده شده میتواند باعث مثبت شدن آزمایش گردد که باید این موضوع را به پزشک اطلاع دهید .

اگر به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا می باشید و خونریزی واضحی از این ضایعات مشاهده می کنید ، قبل از انجام آزمایش باید به آزمایشگاه اطلاع دهید .

خانم هایی که دارای عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره فوق باید از انجام این آزمایش خودداری نمایند .

مصرف موادی مانند گوشت ، جگر ، پرتقال ، موز ، سبزیجات(به خصوص شلغم، ترب و تربچه) ، قرص و یا قطره آهن و ویتامین ث تزریقی می تواند سبب ایجاد جواب کاذب شود بنابراین باید به مدت سه روز رژیم غذایی فاقد مواد نامبرده را رعایت نمایید .

در صورت مصرف داروهایی مانند آسپرین ، ایبوپروفن ، ایندومتاسین ، آنتی اسیدها و ترکیبات آهن دار و سایر داروها ، قبل از انجام آزمایش باید به پزشک معالج اطلاع بدهید زیرا این داروها باعث ایجاد تداخل در نتیجه آزمایش می گردند .

* حداقل حجم نمونه جهت آزمایش مدفوع ۵ گرم(به اندازه یک فندق) می باشد *